

Phòng và điều trị bệnh cước chân trâu, bò

1. Nguyên nhân:

Khi thời tiết lạnh dưới 10°C, thường có băng giá, sương muối, cộng với nền chuồng ẩm, ướt, lầy thụt mất vệ sinh. Mặt khác trâu, bò đứng và nằm trong chuồng nuôi với thời gian dài sẽ làm cho chân Trâu, bò bị tê cóng, hệ thống mao mạch ở chân bị co lại gây trở ngại cho việc lưu thông máu. Nếu thời tiết tiếp diễn lạnh kéo dài từ 3-5 ngày thì hệ thống mao mạch ở chân trâu, bò bị tắc nghẽn dẫn đến hệ thống phù nề xung quanh móng chân, bàn chân, cổ chân làm cho trâu, bò bị đau đớn không đi lại được, hiện tượng đó gọi là bệnh cước chân ở Trâu, bò.

2. Triệu chứng:

Chân trâu, bò sưng ở độ nhẹ có hiện tượng đi chậm chạp, khập khiễng không vững có thể sưng ở một chân hoặc hai chân. Nếu không phát hiện sớm và chữa trị kịp thời thì bệnh sẽ trầm trọng hơn, có thể làm cho chân trâu, bò biểu hiện phù nề, dịch xuất tiết nhiều sưng tấy, nhiều vết tím đỏ, hoặc có vết nứt da, rỉ nước màu vàng, hệ thống mao mạch ở vùng bàn chân bị tắc làm cho vùng da xung quanh móng và bàn chân bị hoại tử dẫn đến chân trâu, bò bị nhiễm trùng kế phát khiến cho trâu, bò không đứng dậy đi lại được. Nếu vết thương bị nặng, sâu sẽ làm cho trâu, bò què nằm tại chỗ.

3. Phòng bệnh:

Bệnh cước chân ở trâu, bò không phải là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh LMLM nhưng bệnh này có thể xảy ra hàng loạt và ảnh hưởng đến sức cày kéo, đi lại của trâu, bò. Để phòng bệnh cước chân ở trâu, bò bà con chăn nuôi cần phải thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Chuồng Trại: Gia cố, tu sửa, đảm bảo chuồng trại đủ ẩm, cao ráo, sạch sẽ, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm ướt nền chuồng. Dự trữ chất đốt: củi, trấu, mùn cưa....để sưởi ấm cho trâu, bò (lưu ý cần có ống khói ra ngoài để tránh ngạt).

- Tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng:

- + Trồng cỏ, ngô dày, dây khoai lang trên diện tích đất không sử dụng trồng cây vụ đông, đất hoang để làm thức ăn.

- + Bổ sung thêm tinh bột (cám gạo, ngô, khoai, sắn) với lượng 0,5g/kg thể trọng, cho uống thêm muối ăn với lượng 5g/100kg thể trọng hòa với nước ấm cho uống.

- + Có kế hoạch chế biến, tích trữ thức ăn cho trâu, bò khi thức ăn thô xanh khan hiếm. Một số loại thức ăn như rơm khô, cỏ khô, thức ăn ủ ure, thức ăn ủ chua (lá sắn, dây khoai lang,..) Không chăn thả trâu, bò vào những ngày rét đậm, rét hại nhiệt độ dưới 120°C, cần mặc áo ấm cho trâu, bò bằng bao tải gai hoặc vải bạt.

- * Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trâu, bò: Vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng ...

- * Định kỳ vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại môi trường chăn nuôi 01 lần/ tuần.

4. Điều trị:

Khi trâu, bò bị cước chân cần phải rửa sạch, lau khô chân trâu, bò. Dùng gừng hoặc riềng đã nhỏ, sao nóng cho vào túi vải trườm vào chỗ sưng để tan máu tụ nhằm lưu thông mạch máu trở lại, ngày trườm 02 lần.

Nếu chỗ cước đã nhiễm trùng phải rửa sạch bằng dung dịch thuốc tím 1% sau đó rắc bột Tetracylin hoặc Sunfamid.

Bệnh nặng, cần cắt bỏ những tổ chức hoại tử sau đó mới điều trị. Tiêm bắp một trong các loại kháng sinh sau Pen-Strep 6.000 - 12.000 UI/kg thể trọng/ngày; Ampicillin 10 - 15 mg/kg TT/ngày; Colinorxacin 1ml/12 kg TT/ngày; Amtyo 10 - 12 ml/100 kg TT/ngày kết hợp trợ sức, trợ lực: tiêm bắp Cafein 20 - 25 mg/kg P, B- Comlex 4 ml/100 kg thể trọng. Điều trị liên tục 5 - 7 ngày sẽ khỏi bệnh.

Trên đây là các biện pháp phòng và điều trị bệnh cước chân cho trâu, bò bà con chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp trên để đảm bảo sức khỏe cho Trâu, bò nhà mình trong những ngày giá rét.