

## **Biện pháp phòng trừ sâu keo hại lúa**

### **1. Đặc điểm nhận biết**

- Ngài: thân dài 14-16mm, sải cánh rộng 30-36mm. Đầu, ngực màu nâu tối, toàn thân màu đen xám.

- Trứng hình cầu hơi dẹt, đường kính khoảng 0,47-0,51mm. Trứng xếp thành hàng hoặc chõng thành ổ, có lông phủ màu vàng xám.

- Sâu: sâu non đầy sức dài 35-37mm, màu sắc thay đổi nhiều. Sâu tuổi 5-6 có màu lục lam.

- Nhộng dài 17-18mm, màu nâu đỏ.

Sâu non gây hại cả lá lúa và bông lúa, tập trung thành đám.

### **2. Điều kiện phát sinh gây hại**

Sâu ưa nhiệt độ cao và ẩm độ bão hoà. Hàng năm, sau những trận mưa tập trung, kéo dài gây ngập, lụt, úng thì thường tiếp theo là nạn dịch sâu keo phát sinh phá lúa mùa.

Hàng năm, cần chú ý các đợt sâu: Đợt 1 từ hạ tuần tháng 6 - hạ tuần tháng 7, đợt 2 từ hạ tuần tháng 7 - hạ tuần tháng 8.

### **3. Biện pháp phòng, trừ**

- Làm đất kỹ, dọn sạch cỏ dại trong ruộng và bờ.

- Dùng bã chua ngọt để bẫy diệt trưởng thành theo công thức: mật (4 phần) + rượu (1 phần) + dấm (4 phần) + bột thấm nước Padan với tỷ lệ bằng 1/100 trọng lượng các hỗn hợp trên. Mỗi hecta có thể cắm 20-30 bó, 4-5 ngày thay bó mới và đem thiêu huỷ các bó cũ.

- Khi phát hiện có sâu non tuổi nhỏ quanh bờ ruộng hay trong ruộng hoặc sau khi ra rộ 4-5 ngày cần kịp thời tổ chức phun thuốc.