

Phòng và trị bệnh đóng dấu trên lợn

1. Nguyên nhân

Bệnh do một loài vi khuẩn Gr (+) gây ra. Bệnh hay gặp ở lợn sau 3 tháng tuổi và thường ghép với tụ huyết trùng lợn.

2. Triệu chứng

Lợn sốt cao trên 40°C, bỏ ăn, sưng khớp, da có vết dấu hình vuông, hình chữ nhật, hình lục giác màu đỏ, ấn tay vào thì mất, bỏ tay ra lại xuất hiện. Cuối kỳ bệnh da bị hoại tử và bong ra, cong vênh lên từng đám.

3. Bệnh tích

Thể cấp tính: Xuất huyết da; dạ dày, ruột, tim, phổi, gan và thận sưng.

Thể mãn tính: Viêm khớp và viêm màng trong bao tim

4. Phòng, điều trị bệnh

a. Phòng bệnh

- Vệ sinh chuồng trại, chế độ ăn đầy đủ để tăng khả năng đề kháng của lợn.
- Tiêm phòng vac xin nhược độc đóng dấu lợn, tiêm lúc lợn 3 tháng tuổi và cứ 6 tháng tiêm lại 1 lần.

b. Điều trị bệnh

- Tiêm bắp ngày 2 lần bằng một trong các loại thuốc: Penicillin, Pen – Kana, Getamycin ... theo chỉ dẫn ghi trên nhãn thuốc. Ngoài ra cần tiêm thuốc hạ sốt, trợ lực, trợ sức cho lợn như Vitamin B1, Cafein, Analgin ... kết hợp với điều trị, phải chăm sóc tốt cho lợn bệnh.