

## **Phòng trị bệnh Niu Cát Xon trên gà (Bệnh gà rù)**

### **1. Nguyên nhân**

Bệnh do vi rút gây ra, gây hại cho mọi lứa tuổi ở gà. Bệnh lây lan rất mạnh, khi bị bệnh tỷ lệ gà chết rất cao từ 90 - 100%.

### **2. Triệu chứng**

Trong đàn xuất hiện những con gà ủ rũ, xã cánh (gà khoác áo tơi), mào thâm, ăn ít, điều căng chứa đầy hơi hoặc thức ăn không tiêu, gà khó thở thường kêu "toóc - toóc" nhất là vào ban đêm, da khô, chân lạnh, cầm chân dốc ngược có nước chảy ra ở mỏ. Gà ỉa chảy phân màu trắng hay xanh, nhớt.

### **3. Bệnh tích**

- Xác gầy, điều chứa đầy thức ăn, nước.
- Xuất huyết ở lỗ huyết.
- Xuất huyết lỗ đổ ra của dạ dày tuyến (cuống mề), ruột bị viêm, xuất hiện những nốt loét có phủ bựa màu trắng vàng.
- Xuất huyết manh tràng.

### **4. Phòng, điều trị bệnh**

Bệnh này không thuốc chữa mà chỉ có phòng bệnh, các biện pháp phòng bệnh gồm

- Không nên nuôi chung gà các lứa tuổi; đảm bảo đầy đủ thức ăn, nước uống đủ chất, sạch sẽ; chuồng khô ráo; không nhốt chung gà mới mua về với gà khỏe đang nuôi, cần cách ly nuôi riêng trong vòng 10 ngày.
- Phương pháp dùng vắc xin: Nhỏ mắt, mũi, miệng cho gà con dưới 1 tháng tuổi vắc xin Lasota vào 3 ngày tuổi và 21 ngày tuổi. Tiêm vắc xin Niu cat xon (Newcastle) hệ 1 cho gà sau 1 tháng tuổi. Thời gian miễn dịch được 6 tháng.