

## Phòng trị bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính cho trâu bò

### 1. Nguyên nhân

- Do thức ăn mất phẩm chất, nước uống bẩn, chế độ chăm sóc, sử dụng, quản lý đàn gia súc kém, gia súc bị suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém.

- Do tác động của các chất độc kích thích vào vách ruột: Hg, CCl<sub>4</sub>, Pb, NaCl, thuốc trừ sâu, chloralhydrat...

- Do kế phát từ các bệnh truyền nhiễm: Nhiệt thán, dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng...

- Do kế phát từ các bệnh ký sinh trùng đường máu: lê dạng trùng, biên trùng, tiên mao trùng...

- Do kế phát từ các bệnh nội khoa: Viêm gan, gan thoái hoá mỡ.

- Do bội nhiễm các vi khuẩn có hại ở đường tiêu hoá khi sức đề kháng bị giảm.

### 2. Triệu chứng

- Con vật sốt cao 40 - 41°C, bỏ ăn, mệt mỏi, kém nhai, miệng có mùi hôi, nhiều nước bọt loãng. Gia súc nhỏ hay bị nôn, ruột non và dạ múi khế tăng nhu động.

- Trạng thái phân: khi sốt đi táo, sau đi lỏng, phân đen màu bùn lẫn nhiều nước, ỉa vọt cần cầu, trong phân có lẫn máu, màu cà phê, có màng giả (ở trâu bò thể màng giả màu trắng dài hàng mét). Gia súc đi ỉa 20 - 30 lần/ngày. Loét ở niêm mạc miệng. Sau đó nhiệt độ giảm dần từ 39,5°C xuống 39°C rồi xuống 37°C. Con vật bị lạnh ở 4 chân và cuống tai, mắt hõm sâu, lông xù, gầy sút rất nhanh, cuối cùng con vật nằm xuống không đứng dậy được, liệt dạ cỏ.

- Nước tiểu: Con vật bí đái, nước tiểu đục có lẫn protein, bilirubin. Khi nhiệt độ giảm đến 35°C gia súc chết.

### 3. Điều trị

- Hộ lý: Giữ ấm cho con vật, bắt nhịn ăn 2 - 3 ngày, chỉ cho uống nước và điện giải, glucoza.

- Thải trừ chất chứa trong đường tiêu hoá, thụt rửa ruột.

- Dùng các thuốc kháng sinh: Biomyacin, Streptomycin, Neomycin, Ampicilin...

- Dùng thuốc sát trùng: Thuốc tím 0,1% uống ngày 2 lít chia 2 lần.

- Formol 10 - 15ml/con. Uống thêm chất chất như nước sắc búp che, lá ổi, quả hồng xiêm xanh, chuối xanh...

- Ichthyol 20 - 25g/con pha vào nước cho uống.

Chú ý: Chuẩn đoán sớm, điều trị kịp thời bệnh mới có hiệu quả cao.