

## Phương pháp trị bệnh liệt dạ cỏ ở trâu bò

### 1. Nguyên nhân

- Do điều kiện ngoại cảnh: thay đổi về thời tiết, khẩu phần ăn, khai thác gia súc quá sức. Với bò sữa thường do thiếu vận động và ăn quá nhiều thức ăn tinh.

- Do kế phát từ các quá trình bệnh lý làm giảm nhu động: sốt cao, cảm nắng, cảm nóng, viêm màng bụng...

### 2. Triệu chứng

Con vật giảm hay bỏ ăn; giảm nhai lại, không ợ hơi, khát nước, miệng hôi, khô, có bọt lưỡi, vùng dạ cỏ mềm. Nếu không kế phát chương hơi, thể tích dạ cỏ không tăng. Bệnh kéo dài, hõm hông bên trái lõm sâu, thông xuống phía dưới (xệ xuống). Gia súc bị táo bón, bí ỉa. Nếu bệnh kéo dài, con vật sốt cao do bị viêm ruột cấp. Có thể bị đi ỉa ra máu.

### 3. Điều trị

Bệnh kéo dài quá 10 - 15 ngày, tiên lượng sẽ rất xấu, khó điều trị.

Hộ lý tăng cường vận động, giảm thức ăn tinh, tăng thức ăn thô, xanh, cho uống nước không hạn chế.

Xoa bóp, kích thích nhu động dạ cỏ bằng các tinh dầu thực vật, ngày 2 - 3 lần, mỗi lần 10 - 15 phút hay có thể dùng các thuốc: pilocarpin 0,2 - 0,3g/con, tiêm dưới da; strychnin sulphat 0,05-0,1g/con.

Thải trừ các chất chứa bằng cách: Uống thuốc tẩy  $MgSO_4$ ,  $Na_2SO_4$ , thụt rửa dạ cỏ bằng dung dịch Natri bicarbonat 1%.

Ức chế sự lên men của vi sinh vật dạ cỏ, giống như trong bệnh chương hơi dạ cỏ.

Dùng các thuốc làm giảm sự toan huyết: Tiêm tĩnh mạch dung dịch  $NaHCO_3$  3%, liều lượng 200-300ml/con, glucoza ưu trương 20-40% liều lượng 300-500ml/con.

Dùng các thuốc trợ tim, trợ sức Vitamin B1, Cafein.