

Phòng trừ sâu đục thân 5 vạch đầu đen

1. Đặc điểm nhận biết

- Ngài: cánh trước màu vàng nâu, mép ngoài cánh có 7 chấm đen. Cánh sau màu nâu vàng nhạt, lông viền cánh màu bạc trắng.
- Trứng: hình bầu dục và dẹp. Trứng mới đẻ màu trắng, dần dần chuyển thành màu vàng nhạt – vàng tro. Trứng trong ổ xếp theo dạng vảy cá, thường là 1 – 3 hàng, nhiều nhất là 5 hàng.
- Sâu non đầy sức dài 16 – 25mm. Đầu màu đỏ đậm tới hoặc đen. Mặt bụng của ngực màu trắng mờ xen lẫn màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt. Lưng có 5 vạch dọc.
- Nhộng: Lúc mới vào nhộng có màu vàng, mặt lưng có 5 vạch dọc màu nâu gụ.

2. Điều kiện phát sinh gây hại:

- Sâu đục thân 5 vạch đầu đen gây hại nhiều và mật độ cao trên các trà lúa chiêm, xuân cấy sớm hơn so với các trà khác.
- Trong năm sâu thường phát sinh 6 lứa, quan trọng nhất là lứa 2 (phát sinh cuối tháng 3 - giữa tháng 4) và lứa 3 (đầu tháng 5 - đầu tháng 6) gây hại đáng kể đối với lúa chiêm xuân.

3. Biện pháp phòng trừ:

- Thường xuyên điều tra để dự báo chính xác lứa sâu.
- Sau khi thu hoạch thu rơm rạ đem đốt hoặc cày ngâm dầm để diệt nguồn sâu.
- Chăm sóc, bón phân hợp lý.
- Phun phòng trừ bằng các loại thuốc Padan 95SP, Regent 800WP. Dùng thuốc Basudin 10G trộn với đất bột, rắc khi bướm rộ. Khi rắc thuốc chú ý ruộng phải có nước.