

## **Phòng và trị bệnh lợn nghé trên lợn**

### **1. Nguyên nhân.**

Bệnh do xoắn khuẩn gây ra. Bệnh lây lan qua đường ăn uống, tiếp xúc trực tiếp hay qua đường sinh dục. Chuột và các loài côn trùng là nhân tố trung gian truyền bệnh, làm cho bệnh lây lan.

### **2. Triệu chứng**

Lợn bỏ ăn, kém vận động, sốt nhẹ 40 – 40,5<sup>0</sup>C và sốt ngắt quãng trong từ 3 – 5 ngày, lợn bị ỉa chảy. Sau đó, xuất hiện những triệu chứng điển hình như vàng da, đái ra máu hay huyết sắc tố, nước tiểu vàng và sánh, lợn xuất hiện triệu chứng thần kinh quy nửa thân sau. Nếu là lợn đực thì bao dương vật sưng to, lợn gầy rộc; còn nếu là lợn cái chữa sẽ có hiện tượng lợn xảy thai hay thai chết lưu.

### **3. Bệnh tích**

Bệnh tích điển hình là: da vàng, xuất huyết tràn lan, gan, thận, lách sưng to màu đất thó hay màu vàng, có nhiều điểm hoại tử, thịt màu vàng có mùi khét đặc trưng, tử cung bị viêm chứa nhiều dịch rỉ viêm và có mùi hôi thối khó chịu. Nếu là bào thai vừa bị xảy thường có các điểm xuất huyết trên bề mặt da toàn bộ cơ thể.

### **4. Phòng, điều trị bệnh**

#### **a. Phòng bệnh**

- Thực hiện tốt khâu vệ sinh phòng dịch, tích cực tiêu diệt chuột và các loại côn trùng.

- Tiêm vắc xin xoắn trùng vào lúc 4 và 10 tháng tuổi, mỗi đợt tiêm 2 lần, cách nhau 10 ngày.

#### **b. Điều trị**

Dùng các loại kháng sinh nhóm Penicilin, Streptomycin, các chế phẩm chứa Tylosin hay Tiamulin với liều theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc, tiêm cho lợn ngày 2 lần trong vòng 5 – 7 ngày. Có thể dùng chế phẩm Leptocin 1ml/8-10 kg lợn, điều trị cho kết quả cao.

Lưu ý: Để điều trị bệnh có kết quả, cần phải kết hợp điều trị nguyên nhân cùng với việc trợ sức, trợ lực và giải độc bằng cách tiêm các loại thuốc bổ như Vitamin B1, B.Complex, Vitamin B12 ... truyền dung dịch Glucoza qua tĩnh mạch tai hay tiếp vào xoang bụng cho lợn.