

## Kinh nghiệm thiến trâu, bò

Khi tiến hành thiến, trâu, bò phải được buộc chắc chắn. Nơi thiến cần kín đáo, ít người và vật qua lại. Bò đực thiến khi được 6-8 tháng tuổi. Trâu đực thiến lúc 8-10 tháng tuổi là tốt nhất.

*Bố trí giá đỡ khi thiến trâu, bò:* Chôn thêm một cọc bên cạnh cây thẳng đã chọn, khoảng cách vừa bằng chiều ngang nơi cổ con vật. Buộc đóng chắc đỡ ngang giữa 2 cột dưới cổ trâu, bò. Đồng thời chôn 2 cột thẳng làm giá đỡ phía sau, khoảng cách hai cột bằng chiều rộng của hai bên hông. Buộc hai đóng đỡ phía trên và dưới vừa với chiều cao của lưng và bụng con vật.

Đặt trâu, bò vào giá qua hai cọc sau. Buộc 2 thanh ngang cố định phía đầu, cổ và lưng, buộc thêm một đóng ngang đỡ bụng con vật. Dùng dây buộc một chân sau con vật vào chân cột để chúng không đá được.

*Tiến hành thiến:* Dùng nước ấm rửa sạch, sau đó lấy cồn 70-90 độ sát trùng xung quanh dịch hoàn. Tay trái bóp chặt túi chứa 2 dịch hoàn (bìu dái), ép thật căng. Tay phải cầm dao sắc, rạch một đường dài 4-6cm ở đường trắng giữa hai dịch hoàn theo chiều trên xuống dưới. Tay trái giữ dịch hoàn bên trái, dùng bông, gạc lau sạch máu, tay kia cầm dao hay kéo sắc tách lớp cơ và màng trắng bao quanh dịch hoàn. Rồi lấy tay phải tiếp tục nắm đầu dịch hoàn trái kéo nhẹ, tay trái bóp mạnh sao cho toàn bộ dịch hoàn trái và phần phụ rời ra ngoài. Tay phải cầm và tiếp tục hơi kéo dịch hoàn, tay trái vuốt màng trắng lên trên cuống dịch hoàn. Lấy kim thiến hoặc panh kim loại kẹp chặt cuống dịch hoàn. Tay trái giữ chắc kim, tay phải xoắn dịch hoàn cho đến khi đứt đối với trâu, bò non. Trâu bò loại thải khi thiến cũng có thể dùng cách này hoặc dùng chỉ chắc buộc cuống dịch hoàn rồi dùng dao cắt. Dịch hoàn phải cũng được lấy ra tương tự như vậy.

Sau khi thiến, lấy bông, gạc lau sạch máu rồi sát trùng bằng cồn, khâu 2-3 mũi phía sau bìu dái. Bôi vết mổ bằng các loại kháng sinh hay thuốc sát trùng có phổ diệt khuẩn rộng như: Penicilin, Steptomycin, Iodine...

Sau khi thiến (khoảng 10 ngày), không để trâu, bò tắm hoặc nằm ở chỗ bẩn, ẩm thấp, tránh ruồi nhặng bâu vào gây nhiễm trùng vết thương. Thường xuyên theo dõi, nếu thấy chỗ thiến sưng to, con vật sốt bỏ ăn cần báo cho cán bộ thú y đến can thiệp kịp thời.

*Nguồn: kinhtenongthon.com.vn*