

Kỹ thuật trồng cây cà tím

Lượng hạt giống để có cây trồng cho 1.000m² là 30 - 40kg. Hạt cần được xử lý bằng nước nóng 54°C trước khi gieo hoặc bằng một trong các loại thuốc: Rovral, Aliete, Zineb... Hạt giống được gieo qua liếp ươm, sau đó chuyển cây non ra trồng trên ruộng.

Thời vụ

- Vụ đông xuân có thể trồng từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Còn vụ hè thu từ tháng 4 - 7.
- Mùa mưa nên tránh trồng vào tháng 5, 6 vì thường bị sâu đục quả gây hại nặng. Vụ đông xuân không nên trồng vào tháng 12 và tháng 1 vì cũng rất dễ bị sâu đục quả gây hại vào khi thu hoạch.

Làm đất

Đất trồng cà tím đòi hỏi phải tơi xốp, nhiều mùn và dễ thoát nước. Nên phơi ải đất vài tuần trước khi trồng. Đất được xử lý bằng vôi và tro bếp với lượng 50kg vôi + 60kg tro bếp cho 1.000m².

- Liếp ươm cũng như liếp trồng cần được vun cao 20 - 25cm. Vụ đông xuân không cần lên liếp.
- Không trồng liên tục nhiều vụ cà tím trên cùng một chân đất và không được trồng trên đất đã trồng các loại cây như: ớt, cà chua, thuốc lá..., nên luân canh với các loại cây họ khác.

Khoảng cách trồng

- Trên liếp ươm, nên gieo hàng với khoảng cách 4 x 4cm. Ở liếp trồng, 2 hàng cách nhau 79 - 80cm, cây cách cây 60cm. Mùa mưa có thể trồng thưa hơn.
- Có thể trồng xen với tỏi hoặc các loại rau khác họ ngải ngày vào giữa 2 hàng cà tím.

Bón phân (lượng bón cho 1.000m²):

- Bón lót: phân chuồng hoai mục 3 - 4 tấn, super lân 35 - 40kg, có bổ sung thêm urê 5 - 6kg, clorua kali (KCl) 3 - 4kg, bánh dầu 12 - 13kg.

- Bón thúc: lần 1 (7 - 8 ngày sau trồng): phân urê 5 - 6kg, KCl 3 - 4kg, bánh dầu 20 - 25kg; lần 2 (25-30 ngày sau trồng): urê 7 - 8kg, KCl 4-5kg; lần 3 (45 - 50 ngày sau trồng): urê 8 - 10kg, KCl 5 - 6kg, bánh dầu 25 - 30kg.

Nên bón thúc thêm vào sau thu hoạch đợt quả đầu tiên: urê 5kg, KCl 5kg và bánh dầu.

Phòng trừ sâu bệnh

Cà tím thường bị các loại sâu bệnh hại chính sau đây: sâu đục trái, rầy xanh, rầy trắng, bọ trĩ, sâu đo xanh, bệnh héo xanh, phấn trắng, thối trái... Cần áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp như vệ sinh đồng ruộng, luân canh với cây trồng khác họ cà. Lưu ý sử dụng thuốc đúng kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả cao.

- Đối với sâu đục trái: phun thuốc vi sinh, một trong các loại thuốc Bt (Dipel, Biocin...); dùng luân phiên với thuốc hoá học như Decis, Delta...; có thể dùng chế phẩm có nguồn gốc thảo mộc.

- Đối với rầy xanh, rầy trắng: dùng một trong các loại thuốc Sumicidin, Polytrin kết hợp trừ sâu đục trái với thuốc Applaud, Confidor...

Với các bệnh khác: nên dùng thể phun như: Topsin M, Ridomil MZ, Score..

Nguồn: Vietlinh.com.vn